



د ماشومانو لپاره د کوویډ-19 ویکسین

د بوسټر خوراک ایا یو بوسټر اړین دی؟	خوراک د بالغ شخص د خوراک په پرتله	لړۍ / سلسله څو ویکسن، او کله	عمر
فایزر			
په دې وخت کې نه	لسمه برخه	د 3 دوزونه سلسله: د 2 دوزونه، د 3 اونیو په فاصله کې او دریم دوز، کم اسکم د 2 میاشتو وروسته	د 6 میاشتو څخه تر 4 کلونو پورې
آو، خو کم اسکم د دویمې دوز نه 5 میاشتې وروسته	درېیمه برخه	د 2 دوزونه سلسله: د 2 دوزونه، د 3 اونیو په فاصله کې	5-11 کلن
آو، خو کم اسکم د دویمې دوز نه 5 میاشتې وروسته	برابر	د 2 دوزونه سلسله: د 2 دوزونه، د 3 اونیو په فاصله کې	12-17 کلن
موډرنا			
په دې وخت کې نه	څلورمه برخه	د 2 دوزونه سلسله: د 2 دوزونه، د 4 اونیو په فاصله کې	د 6 میاشتو څخه تر 5 کلنۍ پورې
په دې وخت کې نه	نیمايي برخه	د 2 دوزونه سلسله: د 2 دوزونه، د 4 اونیو په فاصله کې	6-11 کلن
په دې وخت کې نه	برابر	د 2 دوزونه سلسله: د 2 دوزونه، د 4 اونیو په فاصله کې	12-17 کلن

ده معلومات د ناروغيو کنټرول او مخنیوي مرکزونو لخوا د جون 18، 2022 پورې دي
د کوویډ-19 تازه معلوماتو او ویکسین لارښود لپاره، د [CDC.gov/coronavirus](https://www.cdc.gov/coronavirus) لیدنه وکړئ